



INDICACIONES PARA EL PACIENTE DE ECOENDOSCOPIA

- Debe permanecer en ayunas desde ocho horas antes de la prueba. Si es necesario tomar algún medicamento, lo ingerirá con una pequeña cantidad de agua. Como medicamentos de la presión o tiroides, No tome antiácidos.
- Una semana antes suspenda la toma de antiagregantes (medicamentos utilizados para prevenir la trombosis) como ácido acetilsalicílico (Aspirina, Adiro, Bioplak, Tromalyt) y clopidogrel (Iscover o Plavix).
- Si está tomando anticoagulantes como Sintrom, Aldocumar o Tedicumar, es necesario suspenderlos 3 a 5 días antes de la prueba y sustituirlos por otro tipo de anticoagulante inyectado, siguiendo las normas de su médico encargado de la anticoagulación.
- No se olvide de leer el consentimiento informado, que deberá firmar antes de realizar la exploración.
- Informe a la enfermera y al médico que le va a realizar la prueba sobre cualquier enfermedad importante que padezca, alergias y medicamentos que toma habitualmente.
- Debe traer todos los estudios más recientes de sangre y de RX o imagen para información al médico así como laboratorios permisibles con tiempos de coagulación con INR menor a 1,5 y actividad superior al 60% caso contrario se diferirá procedimiento endoscópico.
- Debe estar acompañado con su familiar ya que ante cualquier eventualidad puede hospitalizarse al paciente o enviar a su domicilio con cuidados del familiar según evolución y riesgos.

Normas para después de .

- Dieta Líquida durante 24 horas.
- En caso de dolor e intolerancia a la vía oral acudir a urgencias.